



# Kattenstaartdikpoot (*Melitta nigricans*)

## Kort:

- Herkenning
- Verspreiding in Vlaanderen
- Habitat en levenswijze



Vrouwje Kattenstaartdikpoot met groen stuifmeel van Grote kattenstaart aan de achterpoten



Grote kattenstaart



Verspreiding Kattenstaartdikpoot in Vlaanderen ([www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be), 10/7/2014)

## Herkenning en verspreiding

Dikpootbijen zijn sterk behaarde bijen die veel op zandbijen lijken. Ze onderscheiden zich echter door verdikte, blaasvormige, laatste tarsleden.

De **vrouwjes** van de Kattenstaartdikpoot worden gekenmerkt door een bruinzwarte beharing op het borststuk. Het achterlijf is zwart met brede, roomkleurige haarbanden. Het 5<sup>e</sup> en 6<sup>e</sup> achterlijfssegment is in het midden zwart en opzij wit behaard. De tarsleden zijn oranje. Ze dragen na het bloembezoek opvallende, groene stuifmeelklompjes aan de achterpoten. De **mannetjes** hebben een bruine lichaamsbehaaring en brede roomkleurige haarbanden op het achterlijf. Mannetjes en vrouwjes zijn 10 tot 12 mm groot.

De Kattenstaartdikpoot lijkt verspreid over geheel Vlaanderen voor te komen. In West-Vlaanderen ontbreekt ze echter nog grotendeels. Mogelijk is de soort hier onderbemonsterd.

Help ons de huidige verspreiding van deze soort in kaart te brengen! Geef uw waarnemingen door via [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be)! Maak, indien mogelijk, ook foto's. Dit vergemakkelijkt de controle van de waarnemingen.

## Habitat en levenswijze

De Kattenstaartdikpoot vliegt van half juni tot eind augustus. De soort kent een gespecialiseerd bloembezoek op Grote kattenstaart (*Lythrum salicaria*). In ons land verzamelt ze uitsluitend stuifmeel op deze plant. Dit wordt vermengd met nectar aan de achterpoten getransporteerd.

Het vrouwje graaft haar nest in de grond. Vooral open plekken in de vegetatie worden hiervoor benut. Mannetjes slapen soms in grote groepen bij elkaar op Grote kattenstaart. Zij patrouilleren ook vaak rond groeiplaatsen van kattenstaart.

De Kattenstaartdikpoot komt voor op de overgang van natte en drogere milieus waar de voedselplant ruim aanwezig is: langs rivieren, plassen, poelen, greppels en beken. Ook vaak aangetroffen in stedelijk gebied, in parken en in tuinen.

De Zwartsprietwespbij (*Nomada flavopicta*) is de specifieke broedparasiet. Dit is een van de weinige zomer-actieve wespbijen. Ze is vaak terug te vinden op composieten, zoals bv. Heelblaadjes (*Pulicaria dysenterica*).

\* Niet agressief.

\* Met voorkeur voor Grote kattenstaart.

\* **GEEF WAARNEMINGEN VAN DEZE SOORT DOOR VIA [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be)!**

\* Maak, indien mogelijk, ook foto's. Dit vergemakkelijkt controle van de waarnemingen.



Bloembezoekend vrouwje



Slaapgezelschap mannetjes



Vrouwje Zwartsprietwespbij