



# Rode maskerbij (*Hylaeus variegatus*)

## Kort:

Herkenning

Verspreiding in Vlaanderen

Habitat en levenswijze



## Herkenning en verspreiding


Van de Rode maskerbij zijn slecht een beperkt aantal waarnemingen bekend, voornamelijk van de zandgronden in de Kempen. Het vrouwtje is makkelijk te herkennen door de combinatie van de gele tekening op de voorzijde van de kop en het borststuk in combinatie met de eerste achterlichaamssegmenten die rood gekleurd zijn. De mannetjes hebben geen rood op het achterlichaam en hebben een volledig gele tekening op de voorzijde van de kop en verdikte antennes die half geel/zwart gekleurd zijn. Op de achterkant van het borststuk zijn vaak twee gele stippen te zien.

## Habitat en levenswijze

De Rode maskerbij is een zomersoort die vliegt van juni tot augustus. De waarnemingen komen voornamelijk van de Kempische schrale zandgronden. De soort wordt vaak aangetroffen op Zandblauwtje. Op zulke plekken waar je deze combinatie vind, kan je dan ook best op zoek gaan naar deze fraaie soort.



- \* belangrijk voor bestuiving van eenjarige planten.
- \* makkelijk te herkennen aan de drie kleuren,
- \* heb je deze bij gespot? Graag ingeven op [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be)!



Verspreiding in Vlaanderen volgens gegevens uit [waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be). (1/3/2013)  
De afbakening die op kaart te zien is zijn de UTM 5\*5 km-hokken.

Voor meer informatie contact:  
[bijen@natuurpunt.be](mailto:bijen@natuurpunt.be)

Foto's : Kobe Janssen

Auteur: Kobe Janssen

Bron: [www.nederlandsebijen.nl](http://www.nederlandsebijen.nl)  
[www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be)

Aculea is de Natuurpunt werkgroep die zich bezig houdt met de studie van wilde bijen en wespen.  
<http://www.aculea.be>